



AgCelence
Рассчитывая на лучшее

Абакус® Ультра

Один фунгицид — много возможностей
для получения прибыли

Премиум-фунгицид с физиологическим действием для эффективной защиты сельскохозяйственных культур

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА АБАКУС® УЛЬТРА



Действующие вещества

Пиракlostробин (62,5 г/л) + эпоксиконазол (62,5 г/л)



Препаративная форма

Суспензионная эмульсия (с.э.)



Химические группы ДВ

Стробилурины + триазолы



Распределение в растении

Трансламинарный + системный



Механизм действия (Код 11+3, FRAC*)

Пиракlostробин воздействует на митохондрии патогена, блокирует поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба. Эпоксиконазол подавляет образование апрессорий и гаусторий и контролирует рост мицелия и спорообразование.

**механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*



Период защитного действия

3–5 недель в зависимости от нормы расхода, восприимчивости сорта, инфекционной нагрузки и времени внесения.



Упаковка

2 x 10 л



Температура хранения

-5...+40 °C



Гарантийный срок хранения

не менее 2-х лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА АБАКУС® УЛЬТРА

- Двухкомпонентный стробилюринсодержащий фунгицид с высочайшей эффективностью против широкого спектра заболеваний
- Обладает защитным и лечебным действием против возбудителей болезней на различных стадиях их развития
- Продолжительный период защитного действия в сочетании с AgCelence® эффектом
- Эффект AgCelence®:
 - помогает сформировать устойчивость растений к биотическим и абиотическим (засуха, недостаток влаги, воздействие низких температур) стрессам;
 - способствует получению высоких урожаев и наиболее полной реализации генетического потенциала сортов с получением зерна высокого качества;
 - снижает скорость старения листьев, замедляя синтез этилена в растении;
 - препятствует образованию неинфекционной пятнистости листьев ячменя.
- Важный инструмент антирезистентной стратегии
- Увеличивает урожайность и рентабельность производства
- Возможность применения как профилактически, так и при первом проявлении симптомов болезни (куративное)

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Тритикале озимая	1,0–1,5	Септориоз листьев, бурая ржавчина, ринхоспориоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Пшеница озимая и яровая	1,0–1,5	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз листьев		30(1)
Ячмень яровой	1,0–1,5	Сетчатая и темно-бурая пятнистость, мучнистая роса		30(1)
Ячмень озимый	1,0–1,5	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз		30(1)
Лен-долгунец	0,5	Фузариоз, пасмо		30(1)
Свекла сахарная	1,0–1,5	Церкоспороз, фомоз		75(1)
Кукуруза	1,0–1,5	Пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариоз початков		30(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Фунгицид Абакус® Ультра предназначен для защиты листовой поверхности зерновых культур
- Может применяться со стадии 31 по стадию 59 (с фазы первого междоузлия по фазу полного колошения), оптимально в фазы 37–39 (появление - разворачивание флагового листа)
- При планировании первой фунгицидной обработки в ст. 31–32 препарат Абакус® Ультра (в норме расхода 1,0 л/га) можно применять в баковой смеси с фунгицидом Флексити®, 0,15–0,3 л/га при значительном поражении посевов мучнистой росой
- При планировании однократной обработки, фунгицид Абакус® Ультра необходимо применять в норме расхода 1,5 л/га в ст. 37–49 в условиях высокой инфекционной нагрузки (наличия признаков поражения на нижних листьях и условиях, благоприятствующих развитию болезней)
- При применении фунгицида Абакус® Ультра в 2-х и 3-х кратных системах защиты зерновых рекомендуется минимальная норма расхода препарата — 1,0 л/га, при этом интервал между обработками не должен превышать 3–4 недели
- Рекомендуется для ранних профилактических обработок в посевах озимых и яровых зерновых в условиях ожидаемого стресса (легкие почвы, недостаток влаги)



При применении в посевах кукурузы в фазу 8–10 листьев надежно защищает от пузырчатой головни, гельминтоспориоза, ржавчины и снижает последствия физиологического стресса



При применении в посевах сахарной свеклы (для первой профилактической обработки) обеспечивает высокую степень контроля церкоспороза и ржавчины, снижает последствия физиологического стресса.

