

Акробат® МЦ

Универсальный, комбинированный фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА АКРОБАТ® МЦ



Действующие вещества

Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)



Препаративная форма

Водно-диспергируемые гранулы (в.д.г.)



Химические группы ДВ

Морфолины + дитиокарбаматы



Распределение в растении

Локально-системный (диметаморф) + контактный (манкоцеб)



Механизм действия (Код 40+МЗ, FRAC*)

Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов на всех стадиях их развития. Манкоцеб подавляет синтез сразу нескольких ферментов в клетках гриба

**механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*



Период защитного действия

10—14 суток



Упаковка

1 x 10 кг



Температура хранения

-10...+30°C



Гарантийный срок хранения

Не менее 3-х лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА АКТРОБАТ® МЦ

- Комбинация локально-системного и контактного характеров действия предотвращают развитие возбудителя фитофтороза как на поверхности растения, так и в его тканях, что обеспечивает длительный профилактический и лечебный эффект
- Уничтожает возбудителей болезней на всех стадиях. Дает возможность надежно защитить растение от листовой и стеблевой формы фитофтороза. Диметоморф убивает проникший в растение мицелий гриба в течение 2–3 суток после заражения. Это гарантирует успех в случае начавшегося, но не проявившегося внешне заболевания. Существенно снижает спороношение гриба (видимый налет на нижней стороне листа)
- Надежно защищает от фитофтороза не только растения, но и клубни картофеля
- Незаменим в антирезистентной стратегии защиты
- Нет резистентности, в том числе перекрестной, с препаратами из группы фениламинов и др.
- Устойчив к смыванию осадками. Действующее вещество диметоморф полностью поглощается растением в течение 2-х часов после обработки
- Высокая биологическая и экономическая эффективность
- Новая препаративная форма — ВДГ (водно-диспергируемые гранулы)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА КАРТОФЕЛЕ

Акробат® МЦ гибко вписывается в стратегию борьбы с фитофторозом. Первую профилактическую обработку как для контроля скрытой (латентной) инфекции, так и в целях достижения высокого защитного эффекта необходимо провести уже на ранних стадиях развития картофеля (до фазы смыкания ботвы в рядах) или по рекомендации пунктов сигнализации. Дальнейшие обработки проводят с интервалом 10–14 дней в период активного роста растений.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Картофель	2,0	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5 % суспензией препарата. Первая обработка профилактическая — по данным пунктов сигнализации и прогнозов, последующие с интервалом 10–14 дней	20(3)
Огурец (семенные посевы)	2,0	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	— (5)
Томат открытого грунта	1,5	Фитофтороз	То же	20(3)
Томат защищенного грунта	2,0	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации 0,2 % рабочим раствором: первая обработка — при появлении первых признаков болезни; последующие — с интервалом 10–14 дней	3–5(3)
Лук репчатый (кроме лука на перо)	2,0	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка — профилактическая, последующие — при появлении первых признаков болезни с интервалом 10–14 дней	28(3)
Клюква крупноплодная	2,0	Годрония, гибберовая пятнистость листьев, монилиальный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, суховершинность побегов	Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок	74(4)