



Базагран® М

Высокоэффективный послевсходовый гербицид для уничтожения широкого спектра двудольных сорняков

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН® М



Действующие вещества

Бентазон (250 г/л) + МЦПА (125 г/л)



Препаративная форма

Водный раствор (в.р.)



Химические группы ДВ

Бензотиадизиноны + производные хлорфеноксиуксусной кислоты



Распределение в растении

Контактный + системный, поглощается зелеными частями растений и поступает в вегетативные органы размножения (корневища, клубни, столоны) и уничтожает их



Механизм действия

Бентазон (Группа СЗ, HRAC*) относится к ингибиторам фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, фиксацию CO₂ и образование АТФ. *МЦПА* (Группа О, HRAC*) относится к синтетическим ауксинам — регуляторам роста, вызывает чрезмерное деление клеток, усиление дыхательных процессов и истощение запаса углеводов. Отмирание сорняков проявляется через 3–5 суток

*механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)



Период защитного действия

Одна обработка, проведённая в оптимальные сроки, обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода



Упаковка

4 x 5 л



Температура хранения

-5...+40 °C



Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН® М

- Особенно высокоэффективен в посевах льна, а также зерновых с подсевом клевера
- Отличается высокой селективностью к культурам
- Нет ограничений в выборе последующих культур
- Высокоэффективен против широкого спектра двудольных сорняков
- Быстро разлагается в почве не оказывая воздействия на последующие культуры севооборота.
- Обеспечивает эффективный контроль падалицы рапса Clearfield®

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Зерновые яровые и озимые, в т.ч. с подсевом клевера	2,5–3,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)	—(1)
Лен-долгунец	2,7–4,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3–10 см	—(1)
Горох	3,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2–3 листьев культуры	30(1)
Горох овощной	3,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2–3 листьев культуры	—(1)
Клевер луговой, ползучий, гибридный 1-го и 2-го года вегетации	2,5–3,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10–15 см)	—(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН® М

- Базагран® М поглощается преимущественно зелеными частями растений. Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны достаточно смачиваться гербицидом
- Расход рабочей жидкости 200–400 л/га
- Оптимальная температура от +16° С до +20°С, минимальная температура применения — +8 – +12°С