

Базагран®

Высокоизбирательный контактный послевсходовый гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков, в т. ч. устойчивых к 2,4Д и 2М-4Х

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН®



Действующие вещества

Бентазон (480 г/л)



Препаративная форма

Водный раствор (в.р.)



Химические группы ДВ

Бензотиадазины



Распределение в растении

Контактный, поглощается зелеными частями растений



Механизм действия

Бентазон (Группа С3, HRAC*) — ингибитор фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, фиксацию CO₂ и образование АТФ. Отмирание сорняков проявляется через 3–5 суток

**механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)*



Период защитного действия

Одна обработка, проведённая в оптимальные сроки, обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода



Упаковка

1 x 20 л



Температура хранения

0...+40 °С



Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН®

- Отлично действует против двудольных сорняков в посевах: зерновых (в т.ч. зерновые с подсевом), бобовых, зернобобовых, отлично переносится данными культурами
- Позволяет получать чистые семена клеверов, полностью исключая проблему их очистки от трудноотделяемых семян сорных растений (подмаренника цепкого, видов ромашки, подорожника, горца, выюнков и др.)
- Благодаря отличной селективности срок применения гербицида определяется не стадией развития культур, а стадией развития сорняков (2–4-х листьев)
- Быстро разлагается в почве, не оказывая воздействия на последующие культуры севооборота
- Обеспечивает эффективный контроль падалицы рапса Clearfield®
- Обеспечивает эффективный контроль резистентных к производным сульфонилмочевины двудольных сорных растений

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Рожь, пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо	2,0–4,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	— (1)
Зерновые яровые с подсевом клевера	2,0–4,0		Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)	— (1)
Зерновые яровые (ячмень, пшеница, овес) с подсевом люцерны	2,0		Опрыскивание посевов в фазу 1–2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения зерновых)	— (1)
Лен-долгунец	3,0–4,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3–10 см	— (1)
Кукуруза	2,0–4,0	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазу 3–5 листьев культуры	— (1)
Горох (на зерно)	3,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 5–6 листьев культуры	— (1)
Горох овощной	3,0		Опрыскивание посевов в фазу 3–4 листьев культуры	— (1)
	1,5–2,0 + 0,4 л ПАВ Цитовет		То же	— (1)

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Фасоль спаржевая	0,4	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Двукратное опрыскивание: первое — в фазу 2–3 настоящих листьев культуры; второе — по мере появления новых всходов сорняков	— (2)
Соя	1,5–3,0	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник	Опрыскивание посевов в фазу 1–3 настоящих листьев культуры	— (1)
Клевер полевой 1-го и 2-го года вегетации	2,0–3,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10–15 см)	— (1)
Клевер полевой, ползучий и гибридный	2,0–4,0		Опрыскивание семенных посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10–15 см)	— (1)
Люцерна 1-го года вегетации	2,0		Опрыскивание посевов в фазу 1–2 настоящих листьев культуры	— (1)
Люцерна (старовозрастные семенные посевы)	1,5–2,0		Опрыскивание посевов в фазу стеблевания культуры (высота 10–15 см)	— (1)
Райграс однолетний	1,0		Опрыскивание растений в фазу кущения культуры	— (1)
Хмель (старше 3 лет)	4,0	Однолетние двудольные	Опрыскивание плантаций после первого окуличивания (высота 10–15 см)	— (1)
Мята перечная	3,1		Опрыскивание плантаций в фазу 4–6 листьев культуры	— (1)
Галега восточная	2,0	Однолетние двудольные, т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов первого года вегетации в фазу 2–3 листьев культуры	— (1)
Валериана лекарственная (на сырье)	1,0–2	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3–4 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков	— (1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА БАЗАГРАН®

- Базагран® является контактным гербицидом и поглощается преимущественно зелеными частями растений. Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны достаточно смачиваться гербицидом
- Расход рабочей жидкости 200–400 л/га
- Оптимальная температура применения от +18°С до +24°С