



Карамба®

Два в одном — надежный фунгицид и регулятор роста

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА КАРАМБА®



Действующие вещества
Метконазол (60 г/л)



Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)



Химические группы ДВ
Триазолы



Распределение в растении
Системный



Механизм действия (Код 3, FRAC*)

Метконазол ингибирует фермент — С14-диметилазу, выполняющую ключевую роль в синтезе стеролов. Стеролы обеспечивают правильное развитие и функционирование клеточных стенок и мембран грибных клеток. Метконазол, проникая в фитопатогенные грибы, вызывает нарушение их роста, что приводит к их гибели

**механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*



Период защитного действия
4—6 недель



Упаковка
4 x 5 л



Температура хранения
0...+30 °С



Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА КАРАМБА®

В посевах озимого и ярового рапса:

- Формирование оптимальных параметров растений рапса перед уходом в зиму, что повышает зимостойкость культуры и снижает пораженность снежной плесенью
- Способствует образованию сильной корневой системы
- Предотвращение ломкости стеблей и преждевременного полегания благодаря значительному укорачиванию стеблей
- Борьба с фомозом, альтернариозом и цилиндроспориозом в осенне-весенний периоды и защита стручков от альтернариоза
- Гомогенность стручков
- Улучшение ветроустойчивости
- Обеспечивает равномерное и дружное цветение, равномерное созревание
- Повышает урожайность семян
- Обладает ярко выраженным действием (снижение высоты растений рапса, образование большого количества боковых побегов)

Применение Карамба® осенью в посевах рапса



Контроль

Карамба® 0,8 л/га
в фазу 4-х листьев
культуры

В посевах зерновых культур:

- Специализированный фунгицид для защиты колоса от фузариоза, септориоза, альтернариоза, гельминтоспориоза, ржавчины, вплоть до уборки
- Способствует сохранению светло-желтого цвета зерна пивоваренного ячменя
- Повышает параметры качества продовольственного зерна



Карамба® 1,5 л/га на пивоваренном ячмене

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница и тритикале озимые	1,0 – 1,5	Фузариоз и септориоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Пшеница озимая	1,5	Церкоспореллез		30(1)
Тритикале озимая	1,25 – 1,5	Церкоспореллез, корневые гнили	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (ст. 31–32)	30(1)
	1,25 – 1,5	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
Пшеница яровая	1,25	Мучнистая роса, септориоз листьев		30(1)
	1,5	Фузариоз и септориоз колоса		30(1)
Ячмень яровой	1,25 – 1,5	Сетчатая пятнистость, фузариоз и альтернариоз колоса		30(1)
Рапс озимый	0,8	Снежная плесень, корневая гниль, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	20(1)
	0,8	Альтернариоз	Опрыскивание в конце цветения рапса	20(1)
	0,8 – 1,0	Росторегулирующее действие (снижение высоты растений рапса, образование большого количества боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу роста стебля (стадия 30) культуры. Расход рабочей жидкости 200—300 л/га.	20(1)
Рапс яровой	0,8	Альтернариоз	Опрыскивание в конце цветения	20(1)
Капуста белокочанная (маточные растения)	0,6 – 0,8	Серая гниль	Опрыскивание в фазу 4–6 листьев и перед закладкой на хранение	— (2)