

Мессидор®

Непревзойденная защита
зерновых культур от полегания

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРА РОСТА МЕССИДОР®



Действующее вещество

Прогексадион-кальция, 50 г/л + Мепикватхлорид, 300 г/л



Препаративная форма

Концентрат суспензии (к.с.)



Химическая группа ДВ

Ацилциклогександионы + производные четвертичного аммония



Распределение в растении

Системный



Механизм действия

Торможение биосинтеза гиббереллинов



Период защитного действия

Предотвращает полегание зерновых культур до уборки урожая



Упаковка

4 x 5 л



Температура хранения

-10...+30 °C



Гарантийный срок хранения

не менее 2-х лет



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛЯТОРА РОСТА МЕССИДОР®

- Максимальная универсальность в сроках и температурных диапазонах применения
- Широкое «окно» применения - с начала фазы кущения по фазу флаг-лист
- Обширный диапазон «рабочих» температур от +5° до +20 °С, оптимальный: от +7° до +20° С
- Быстрое и безопасное воздействие на растения почти при любой погоде
- Сокращает высоту, увеличивает толщину стеблей
- Стимулирует развитие корней, повышает и сохраняет продуктивную кустистость
- Увеличивает устойчивость к стрессу

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Назначение препарата	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница и тритикале озимые	0,5–1,0	Предотвращение полегания	Опрыскивание в фазу выхода в трубку (стадии 31–32). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	— (1)
	0,5–1,0		Опрыскивание в фазу флагового листа до появления остей колоса (стадии 37–39). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	— (1)
	0,75		Последовательно опрыскивание посевов: — первое — в начале трубкования (стадии 31–32);	— (1)
	0,75		— второе — в фазу флагового листа до появления остей колоса (стадии 37–39). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	— (1)
	1,0		Последовательно опрыскивание посевов: — первое — в начале трубкования (стадии 31–32);	— (1)
	0,5		— второе — в фазу флагового листа до появления остей колоса (стадии 37–39). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.	— (1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Высокий риск полегания

Мессидор®, 0,75–1,0 л/га (ст. 31) + Мессидор®, 0,5–0,75 л/га (ст. 37–39)

Средний риск полегания

Мессидор®, 0,5–1,0 л/га (ст. 31–39)

Низкий риск полегания

Мессидор®, 0,5 л/га (ст. 31–32)

Максимальная эффективность росторегуляции, а так же значительная экономия достигается при применении баковых смесей Мессидор® и ЦеЦеЦе® 750.

1 Низкий-средний риск полегания

Однократное применение
в ст. 31 до завершения ст. 32

- укрепление и сокращение нижних междоузлий;
- больше толщина стебля;
- предотвращение стеблевого и корневого полегания;
- более развитая корневая система;
- повышение стрессоустойчивости растений;
- выше выживаемость продуктивных побегов;
- выше усвояемость воды и NPK;
- выравненный стеблестой.

2 Высокий риск полегания


Двукратное применение:

Первое (базовое) –
в фазу первого узла
(ВВСН 31)

Второе –
в фазу флагового листа
(ВВСН 37-39).

- дополнительное сокращение и укрепление верхних междоузлий;
- укрепление и сокращение подколосового стержня;
- максимально выравненный стеблестой.

Озимая пшеница, озимая тритикале



* - При использовании жесткой воды, для достижения максимального росторегулирующего действия добавить сульфат аммония 0,5 - 1 кг/га в бак опрыскивателя перед добавлением Мессидор®

** - На отстающих в своем развитии посевах (поздние осенние сроки сева, раннее наступление зимы) весной до наступления 30 стадии Мессидор 0,3 л/га применяют для увеличения массы корней, повышения устойчивости растений к стрессу, сдерживания вегетативного роста в длину и предотвращения сброса продуктивного стеблестоя в дальнейшем (повышения выживаемости продуктивных побегов).

***- Выбор нормы при использовании в баковых смесях: ЦеЦеЦе 750: 0,8 л/га – если весной вносили гербицид, солнечно в день внесения; 1 л/га - пасмурно в день внесения; Мессидор: - увеличиваем норму от 0,3 -0,4- 0,5 л/га по мере приближения к 32 стадии

Совместимость с другими препаратами:

Мессидор® можно использовать в баковых смесях с большинством фунгицидов, гербицидов и инсектицидов разрешенных к применению на зерновых культурах. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на совместимость.