

Пиктор®

ПИК урожайности,
ТОПовая рентабельность рапса

Эталонный специализированный фунгицид для защиты рапса против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза и серой гнили, эффективность которого подтверждена в белорусских производственных условиях при эпифитотийном развитии болезней

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА ПИКТОР®



Действующие вещества

Димоксистробин (200 г/л) + боскалид (200 г/л)



Препаративная форма

Концентрат суспензии (к.с.)



Химические группы ДВ

Стробирурины + карбоксамиды (SDHI)



Распределение в растении

Системный + трансламинарный



Механизм действия (Код 11+7, FRAC*)

Димоксистробин блокирует в митохондриях патогена перенос электронов, цитохрома bc1 (комплекс III в цепочке дыхания). *Боскалид* тормозит процесс дыхания гриба посредством блокирования комплекса II в дыхательной цепочке (внутренняя мембрана митохондрии), в результате чего лишает гриб источника энергии, необходимой для синтеза компонентов важных для строительства клеток патогенов

*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)



Период защитного действия

С фазы начала цветения и вплоть до уборки



Упаковка

4 x 5 л



Температура хранения

0...+40 °C



Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА ПИКТОР®

- ПИКТОР® действует как превентивно (профилактически), так и при уже проявившихся признаках болезни, останавливая развитие уже начавшегося инфекционного процесса
- Обладает высочайшей активностью против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза и серой гнили
- Контроль болезней при эпифитотийном, умеренном и депрессивном развитии
- Высокая фунгицидная эффективность благодаря наличию двух инновационных действующих веществ из разных химических классов стробилуринов и карбоксамидов (SDHI)
- Обеспечивает длительное лечебное и защитное действие
- Фунгицид бренда AgCelence® на рапсе и подсолнечнике
- Обладает положительным «физиологическим действием» на культуры
- Эффективно и продолжительно защищает стебли и стручки от альтернариоза
- Достоверно снижает предуборочные потери и потери при уборке урожая за счет высокой стабильности стручков
- Повышает масличность семян рапса
- Эталон биологической и экономической эффективности фунгицидной защиты на рапсе
- Безопасен для медоносных пчел
- Пригоден для авиационного опрыскивания методом УМО

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Рапс озимый и яровой	0,4–0,5	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	35(1)
Рапс озимый	0,5	Серая гниль		35(1)
Подсолнечник	0,4–0,5	Склеротиниоз	Опрыскивание в фазу начала цветения, в т.ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га.	38(1)
Подсолнечник	0,5	Пероноспороз, альтернариоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации	38(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Опрыскивание фунгицидом Пиктор® проводят в фазы: начало цветения (ст. 61) или середина цветения (ст. 65) или завершение цветения — образование стручков (ст. 70)
- Оптимальный срок для применения фунгицида Пиктор® 0,5 л/га — это период от начала до середины цветения (ст. 61–65)
- Максимальная эффективность препарата Пиктор® против склеротиниоза достигается при применении в фазу полное цветение (ст. 65), когда около 50% открытых цветков на главном побеге и первые лепестки только опали
- Рекомендуемая норма расхода: 0,5 л/га при эпифитотийном, 0,4 л/га при депрессивно-умеренном развитии склеротиниоза на яровом рапсе - 0,4 л/га

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДА ПИКТОР®

	Фомоз <i>Phomalingam</i>	Альтернариоз <i>Alternaria spp</i>	Склеротиниоз <i>Sklerotinia spp</i>	Серая гниль <i>Botrytis spp.</i>	AgCelence Выше урожай
Пиктор®	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
					
					
					

●●●●● - максимальная эффективность
 ●●●● - высокая эффективность