



- Воздействует на широкий спектр контролируемых сорняков
- Имеет широкое окно применения
(до посева, после посева до всходов культуры,
по всходам культуры)
- Экономичное решение проблемы сорняков

arystalifescience.ru



Инновации. Динамичность. Результаты



ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9.
т: +7 (800) 222-45-72 ф: +7 (495) 933-59-60
www.arystalifescience.ru
Используйте средства защиты растений безопасно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед применением!



arystalifescience.ru



Инновации. Динамичность. Результаты





720 г/л пропизохлора, концентрат эмульсии

Гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и основными двудольными сорняками

Канистра 20 л
Срок годности – 3 года

Норма расхода, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок последней обработки	Кратность обработок
2,5 – 3,0	Ряпс озимый и яровой	Однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые	Опрыскивание посевов до всходов или в фазу 1 – 2 настоящих листьев культуры		1

Рекомендации по выбору эффективной дозировки

Наилучший результат достигается при применении до всходов сорняков, но при дефиците влаги целесообразно внесение по волне сорняков.

Сроки и дозы применения:

Биологическая эффективность гербицида Пронит®, КЭ в посевах озимого рапса (среднее за 2012 – 2013 гг.)

Влага	Почва	До всходов	По всходам	Вариант	Норма расхода, л/га	Срок применения	На 30 день после внесения	На 40 день по возобновления вегетации по численности	по массе
Достаточное увлажнение	Лёгкая	2,5 л/га	3,0 л/га	Без обработки гербицидами	–	–	98	41	282
	Связная	3,0 л/га		Эталон	2,0	до всходов	88,8	85,5	97,7
				Пронит	2,5	до всходов	89,3	82,9	95,6
				Пронит	3,0	до всходов	91,3	89,2	98,7
Почвенная засуха	Рекомендовано применение по всходам культуры в фазу семядолей сорняков			Эталон	1,7	ДК 11 – 12	71,4	74,1	87,6
				Пронит	2,5	ДК 11 – 12	73,3	75,9	88,4
				Пронит	3,0	ДК 11 – 12	81,0	76,6	92,4

Контроль



Пронит® 2,5 л/га



Производственный опыт, Гродненская обл., Республика Беларусь, 2017 г.

Метазахлор + Квинмерак, 2 л/га



Пронит® 2,5 л/га



Производственный опыт, Минская обл. Республика Беларусь, 2016 г.

Рекомендации по применению

Срок применения

Пронит® может применяться как до, так и после всходов культуры. Главное условие при довсходовом применении для эффективного контроля сорняков – наличие почвенной влаги, поэтому в засушливых условиях рекомендуется применение по волне сорняков, вне зависимости от фазы развития культуры. При этом необходимо учитывать чувствительную фазу сорных растений: не более 1 пары настоящих листьев, и провести обработку в максимально короткие сроки.

Дозы применения

Выбор оптимальной дозы зависит от погодных условий, степени засоренности и содержания гумуса в почве. Чем выше засоренность, так же, как и содержание гумуса в почве, тем выше норма расхода препарата. Влияние наличия почвенной влаги прямо противоположное: чем больше её запас, тем меньшая норма расхода обеспечит надлежащую эффективность.

Механические обработки почвы

Пронит® не требует заделки, более того, неправильная механическая обработка может привести к нарушению гербицидного экрана и негативно отразиться на эффективности, однако, в случае недостатка влаги, возможно применение кольчато-шпоровых катков, в период не более двух часов после внесения препарата.

Падалица зерновых колосовых

Пронит® не является специализированным продуктом для борьбы с падалицей, однако его применение в максимальной дозе позволяет в отдельные годы в определённых условиях успешно контролировать зерновые культуры и отказаться от применения граминицидов.