



Рекс®Дуо

От здоровых листьев к
полновесному колосу без болезней

Основа базовой стратегии защиты от болезней

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА РЕКС® ДУО



Действующие вещества

Эпоксиконазол (187 г/л) + тиофанат-метил (310 г/л)



Препаративная форма

Концентрат суспензии (к.с.)



Химические группы ДВ

Триазолы + тиофанаты



Распределение в растении

Системный



Механизм действия (Код 3+1, FRAC*)

Эпоксиконазол блокирует образование эргостерина в клетках гриба, что ведет к нарушению роста и к гибели патогена. Тиофанат-метил нарушает нормальное деление клетки, подавляет образование ростковых трубок при прорастании спор и конидий

**механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*



Период защитного действия

3–6 недель в зависимости от метеоусловий, восприимчивости сорта и степени инфекционной нагрузки



Упаковка

2 x 10 л



Температура хранения

-10...+40 °C



Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА РЕКС® ДУО

На зерновых

- Обладает высочайшей активностью против септориоза листьев и колоса, видов ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой и темно-бурой пятнистостей
- Высокоэффективен против фузариоза и альтернариоза колоса
- Эффективен в подавлении мучнистой росы и церкоспореллезной прикорневой гнили
- В наилучшей степени сдерживает развитие сапротрофной микобиоты в период созревания зерна, особенно при неблагоприятных погодных условиях (избыточное переувлажнение)
- Обладает профилактическим и лечебным действием
- Эффективно применение методом УМО
- Надежно защищает растения зерновых при применении: ст. 31–32; 37–39; 61–65 (51–55 ячмень)


На сахарной свекле

- Непревзойденный фунгицид в защите культуры от болезней, обладающий профилактическим и искореняющим действием
- Достоверно повышает сахаристость, урожайность и выход сахара
- Длительный период защитного действия — от момента применения до уборки
- Единственный фунгицид против возбудителей кагатной гнили
- Уменьшает потери сахара и корнеплодов в процессе хранения

Карликовая ржавчина




Желтая ржавчина



Септориоз



Бурая ржавчина



Мучнистая роса



Сетчатая пятнистость



РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Рожь озимая	0,6	Мучнистая роса, бурая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании — 5 л/га	20(1)
Тритикале озимая	0,6	Септориоз, ржавчина, ринхоспориоз, фузариоз колоса		20(1)
	0,6	Церкоспореллез, корневые гнили	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (ст. 31–32), в том числе авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании — 5 л/га	20(1)
Пшеница озимая	0,4–0,6	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации, в том числе авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании — 5 л/га	20(1)
	0,6	Фузариоз и альтернариоз колоса		20(1)
Ячмень озимый	0,6	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	66(1)
Пшеница яровая	0,6	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, фузариоз и альтернариоз колоса		20(1)
Ячмень яровой	0,6	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, ржавчина, фузариоз и альтернариоз колоса		20(1)
Овес	0,6	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	66(1)
Горох	0,6	Аскохитоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни	20(1)

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
Свекла сахарная	0,5	Церкоспороз	То же	20(1)
	0,5	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	21(2)
	0,6	Возбудители кагатной гнили при хранении плодов	Опрыскивание в период вегетации	30(1)
	0,6	Рамуляриоз	То же	20(1)
Лен-долгунец	0,6	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	72(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ

- Ст. 31–32 — Рекс® Дуо (0,4–0,6 л/га) + Флексити® (0,15–0,3 л/га) для контроля мучнистой росы, ломкости стебля, септориоза листьев и видов ржавчины
- Ст. 33–39–49 Рекс® Дуо (0,4–0,6 л/га) для эффективной защиты листового аппарата от септориоза, пиренофороза, ринхоспориоза, сетчатой пятнистости и ржавчины, при развитии болезней выше порогового уровня в нижнем ярусе листьев
- Ст. 61–65 (51–55 ячмень) Рекс® Дуо (0,6 л/га) для контроля болезней колоса и продления защиты флагового и подфлагового листа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

- Обработку следует провести профилактически или при первых признаках болезни. Не позволяйте заболеванию развиваться более 5%, т.к. потери будут невосполнимы
- При эпифитотийном развитии болезней рекомендуем: двукратное применение фунгицида Рекс® Дуо 0,5 л/га + 0,5 л/га, с разрывом между обработками не менее 21 дней.
- На гибридах восприимчивых к ржавчине и мучнистой росе:
Абакус® Ультра 1,0 л/га + Рекс® Дуо 0,5 л/га
или
Рекс® Дуо 0,5 л/га + Рекс® Плюс 1,25 л/га