



# Рекс® Плюс

Простое и эффективное  
решение на СТАРТЕ!

Универсальный фунгицид для контроля широкого спектра заболеваний с гибким температурным диапазоном внесения

## ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА РЕКС® ПЛЮС



### Действующие вещества

Фенпропиморф (250 г/л) + эпоксиконазол (84 г/л)



### Препаративная форма

Суспензионная эмульсия (СЭ)



### Химические группы ДВ

Морфолины + триазолы



### Распределение в растении

Системный



### Механизм действия (Код 5+3, FRAC\*)

*Фенпропиморф* ингибирует биосинтез эргостерина в мембранах фитопатогенных грибов за счет подавления  $\Delta 8$ – $\Delta 7$ -изомеразы и  $\Delta 14$  редуктазы. Идеальный компонент баковых смесей с триазолами за счет отличного от азолов механизма действия.

*Эпоксиконазол* — ингибирует фермент 14  $\alpha$ -диметилазу в биосинтезе эргостерола

*\*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)*



### Период защитного действия

3–5 недель в зависимости от метеоусловий, нормы расхода и степени развития болезней



### Упаковка

2 x 10 л



### Температура хранения

-10 ...+40 °C



### Гарантийный срок хранения

не менее 2-х лет



## ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА РЕКС® ПЛЮС

- Системный фунгицид защитного и лечебного действия для профилактических, лечебных и искореняющих обработок в системах защиты озимых и яровых зерновых, сахарной свеклы, рапса, злаковых трав против комплекса важнейших возбудителей
- Обеспечивает защиту от мучнистой росы, ржавчины, септориоза, ринхоспориоза и сетчатой пятнистости уже на начальных этапах роста и развития культуры
- Позволяет СТАРТОВАТЬ с защитой зерновых даже при низких температурах. Благодаря синергизму действующих веществ поглощается поверхностью растений и действует на возбудителей при низких температурах — начиная с 6–7°C
- Смесь эпоксиконазола и фенпропиморфа в современной препаративной форме обеспечивает уникальные характеристики препарата:
  - высокая скорость проникновения, быстрое действие на фитопатогенные грибы и длительное защитное действие от 3 до 5 недель в зависимости от инфекционной нагрузки, восприимчивости сорта и метеорологических условий;
  - позволяет эффективно искоренить обосновавшуюся в посевах мучнистую росу, ржавчину и в дальнейшем обеспечить длительную защиту от септориоза, пиренофороза и других пятнистостей листьев;
  - широкий спектр контролируемых заболеваний — не требует смешивания с другими препаратами;
  - эффективное действие независимо от метеорологических условий — уверенность в эффективности практически при любых метеоусловиях за счет высокой устойчивости к смыванию осадками;
  - низкий риск возникновения резистентности в популяции возбудителей болезней.

## РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

| Культура               | Норма расхода, л/га | Вредный объект                                                             | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Рожь озимая            | 1,25                | Ринхоспориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина                               | Опрыскивание в период вегетации      | 20 (1)                              |
| Пшеница озимая         | 1–1,25              | Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, ринхоспориоз            |                                      | 20 (1)                              |
| Пшеница яровая         | 1,5                 | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина                                  |                                      | 20 (1)                              |
| Ячмень яровой и озимый | 1–1,25              | Мучнистая роса, ржавчина, темно-бурая и сетчатая пятнистости, ринхоспориоз |                                      | 20 (1)                              |
| Тритикале озимая       | 1–1,25              | Мучнистая роса, ринхоспориоз, септриоз листьев, бурая ржавчина             |                                      | 20 (1)                              |

| Культура                             | Норма расхода, л/га | Вредный объект                    | Способ, время обработки, ограничения        | Срок ожидания (кратность обработок)                   |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Рапс яровой                          | 0,75–1,0            | Альтернариоз                      | Опрыскивание в фазу конец цветения культуры | 20 (1)                                                |
| Клевер луговой (семенные посевы)     | 1,25                | Аскохитоз, пиренофороз, антракноз | Опрыскивание в период вегетации             | — (1)                                                 |
| Овсяница луговая (семенные посевы)   | 1,25                | Пиренофороз, септориоз метелки    |                                             | — (1)                                                 |
| Райграс пастбищный (семенные посевы) | 1,25                | Гельминтоспориоз, пиренофороз     |                                             | — (1)                                                 |
| Свекла сахарная                      | 1,25–1,5            | Церкоспороз, фомоз                |                                             | 30 ( не использовать ботву для скормливания скоту), 1 |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФУНГИЦИДА РЕКС® ПЛЮС В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

- Предназначен для защиты листовой поверхности и основания стебля зерновых культур с 25 по 59 стадию (с фазы середины кушения до полного колошения)
- Для эффективного контроля септориоза в посевах озимой пшеницы и тритикале защиту рекомендуем начинать с 32–33 стадий, если болезнь присутствует на 4-м и нижних листьях и условия благоприятны для развития болезни
- Для ограничения развития прикорневых гнилей\*, контроля мучнистой росы и ржавчины на ранних этапах препарат рекомендуется применять в 30–32 стадии развития озимых зерновых
- Для контроля мучнистой росы, ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой пятнистости в посевах ярового ячменя рекомендуем применять в стадии 25–31, озимого ячменя — 30–32, что позволит обеспечить максимальную сохранность продуктивных стеблей и количества колосков в колосе
- Фунгицид Рекс®Плюс предназначен для применения в системах защиты зерновых. При планировании второй обработки препаратами Абакус® Ультра, Адексар® в 37–49 стадии для первой обработки в 25–33 стадии рекомендуем норму расхода 1 л/га Рекс®Плюс
- При планировании однократной обработки фунгицид Рекс®Плюс необходимо применять в максимальной норме расхода 1,25–1,5 л/га не снижая норму расхода рабочего состава, а обработка должна быть максимально приближена к 39 стадии при наличии симптомов поражения на нижних листьях
- При планировании высоких урожаев в благоприятных метеоусловиях для развития болезней в интенсивных посевах в двух- трехкратных системах защиты зерновых можно применять минимальную норму расхода 1 л/га, при этом разрыв между обработками не должен превышать 3–4-х недель

- **NEW!** Согласно рекомендаций Белорусских ученых фунгицид Рекс® Плюс можно применять дробно в системах защиты, например 0,75 л/га (ст. 32-33) + 0,75 л/га (ст. 37-49) при этом интервал между обработками не должен превышать 21 день.
- Препарат Рекс® Плюс рекомендуем в посевах зерновых, размещаемых после благоприятных предшественников с низким - средним риском поражения прикорневыми гнилями и оптимальных сроках сева, на средне и высоковосприимчивых к мучнистой росе и ржавчине сортах

\*— регистрация в странах ЕС.

|                                                                                                                          |  Рожь озимая |  Тритикале озимая |  Ячмень озимый |  Ячмень яровой |  Пшеница яровая |  Пшеница озимая |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Мучнистая роса                         | ●                                                                                             | ●                                                                                                  | ●                                                                                               | ●                                                                                               | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Септориоз листьев                      |                                                                                               | ●                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Септориоз колоса                       |                                                                                               | ●                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Ржавчины                               | ●                                                                                             | ●                                                                                                  | ●                                                                                               | ●                                                                                               | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Сетчатая пятнистость                   |                                                                                               |                                                                                                    | ●                                                                                               | ●                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |
|  Ринхоспориоз                          | ●                                                                                             | ●                                                                                                  | ●                                                                                               | ●                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |
|  Пиренофороз                          | ●                                                                                             |                                                                                                    | ●                                                                                               | ●                                                                                               | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Рамуляриоз                           |                                                                                               |                                                                                                    | ●                                                                                               | ●                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |
|  Церкоспореллезная прикорневая гниль* | ●                                                                                             | ●                                                                                                  | ●                                                                                               |                                                                                                 | ●                                                                                                | ●                                                                                                |
|  Фузариозная прикорневая гниль*       | ●                                                                                             | ●                                                                                                  | ●                                                                                               |                                                                                                 | ●                                                                                                | ●                                                                                                |



- высокая эффективность



- ограничение развития