

Гербицид

Амидосульфурон, 100 г/л +
йодосульфурон, 25 г/л +
мефенпир (антидот), 250 г/л

Препаративная форма:

масляная дисперсия
ODesi® (МД)

Упаковка: 12 x 1 л



Секатор®

ТУРБО



Назначение

Высокоселективный гербицид для борьбы с трудноискоренимыми двудольными сорняками в посевах зерновых, кукурузы и льна-долгунца на основе препаративной формы ODesi®.

Преимущества

- Высокоэффективен против основного спектра двудольных сорняков в т.ч. трудноконтролируемых: *подмаренника цепкого*, *видов осота*, *ромашки*
- Широкий временной и температурный диапазон сроков применения
- Селективность к культуре
- Возможность применения в баковых смесях
- Зарегистрирован для наземного применения и авиаобработок

Химический класс

амидосульфурон – сульфонилмочевины
йодосульфурон-метил-натрий – сульфонилмочевины
мефенпир-диэтил (антидот) – производные пиразолов

Механизм действия

Гербицид системного действия. Быстро поглощается листьями и частично корневой системой, перемещается по всему растению.

Спектр активности

Эффективен против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе трудноконтролируемых: *подмаренника цепкого, падалицы рапса, видов ромашки и горцев*, а также против многолетних корнеотпрысковых – *видов осота*.

Скорость воздействия

Полная гибель происходит в течение 2-3-х недель после опрыскивания в зависимости от погодных условий.

Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях развития малолетних двудольных и в фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений, а также при благоприятных условиях роста (оптимальной влажности и температуре).

Селективность (фитотоксичность)

При неблагоприятных погодных условиях после обработки иногда (на ячмене) наблюдается кратковременное снижение интенсивности зеленой окраски листьев. Физиологическая окраска, как правило, восстанавливается в течение 8-10 суток после обработки.

Особенности применения

- Препарат полностью поглощается в течение 2-х часов. Дождь, выпавший после этого времени, на эффективность препарата не влияет.
- Пониженные температуры воздуха (5-7 °C) до и после обработки не влияют на конечную эффективность гербицида.

Дополнительную информацию по наиболее эффективному использованию препарата смотрите на стр. 6.

Возможное последствие в севообороте

На озимом рапсе при посеве после зерновой культуры, обработанной Секатором® Турбо весной, в редких случаях (засушливый сезон, при минимальной обработке почвы) возможно обесцвечивание семядольных и первых настоящих листьев без дальнейших последствий для развития культуры.

В летний период после вспашки можно высевать пожнивные культуры. В засушливых условиях (осадков менее 100 мм) можно высевать только зерновые культуры.

Замещающие культуры

В случае пересева культур, обработанных Секатором® Турбо, рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен, картофель.

В случае пересева культур, обработанных Секатором® Турбо, на 15-й день после обработки можно высевать яровой ячмень и яровую пшеницу, на 30-й день после вспашки можно высевать кукурузу и картофель.

Совместимость

Секатор® Турбо совместим с большинством гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, регуляторов роста и минеральных удобрений, применяемых на зерновых культурах.

При приготовлении баковых смесей Секатор® Турбо добавляют последним.

В каждом случае, особенно в смеси с микроудобрениями, необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов.

Срок годности и условия хранения

Не менее 2-х лет с даты изготовления при температуре не ниже –5 °C до +30 °C.

Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Рожь, пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	0,1-0,125	Опрыскивание посевов осенью с фазы 2-х листьев – кущения культуры	– (1)
Пшеница, тритикале и ячмень яровые		0,075-0,1	Опрыскивание посевов весной до конца кущения культуры	
		0,075-0,1	Опрыскивание посевов с фазы 2-х листьев – кущения культуры	
		Просо	0,1	
Ячмень озимый		0,1-0,125	Опрыскивание посевов осенью с фазы 2-х листьев – кущения культуры	
Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные	0,075-0,1	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев кукурузы (против мари белой – в фазу не более 2-х настоящих листьев сорняка)	

Секатор® Турбо также зарегистрирован на льне-долгунце (см. стр. 259)

Рекомендуемый расход рабочего раствора:

- для наземного опрыскивания – 200-300 л/га,
- для авиаобработки методом УМО – 5 л/га.