



Шарпей®

циперметрин, 250 г/л

Универсальный быстродействующий инсектицид

Преимущества препарата:

- очень быстрое действие на вредителей («нокдаун-эффект»)
- чрезвычайно широкий спектр уничтожаемых вредителей
- регистрация практически на всех важнейших сельскохозяйственных культурах, а также на территориях зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах
- технологичная препаративная форма – микроэмульсия, устойчивая к воздействию высоких температур
- низкие нормы расхода, экономичность в применении

Назначение:

пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей на зерновых, технических, зернобобовых, овощных, плодовых, кормовых и других культурах, а также на территориях зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах.

Действующее вещество:

циперметрин, 250 г/л.

Препаративная форма:

микроэмульсия.

Эта высокотехнологичная препаративная форма способствует большей устойчивости препарата к воздействию высоких температур.

Характеристика действующего вещества:

циперметрин относится к классу синтетических пиретроидов и обладает быстрым контактно-кишечным действием.

Спектр действия:

грызущие и сосущие вредные насекомые.

Механизм действия:

действует на нервную систему вредителей. Кроме того, препарат способен нарушать откладку яиц у имаго и питание у личинок.

Скорость воздействия:

в течение 10 - 15 мин после обработки вредители перестают передвигаться, а затем в течение 1,5 - 2 ч гибнут в результате общего паралича всех органов.

Период защитного действия:

в зависимости от вида вредителя, стадии его развития и погодных условий составляет от 7 до 14 дней.

Рекомендации по применению:

Шарпей® используют для опрыскивания растений в период вегетации при появлении вредителей. Обработку посевов культур против вредителей всходов проводят по всходам. Для усиления эффективности Шарпея® в рабочий раствор целесообразно добавить ПАВ Адью®, 0,2 л/га.

При обработке незагруженных складских помещений и оборудования зерноперерабатывающих предприятий допуск людей и загрузка складов возможны через 24 ч после обработки.

При обработке хранящегося зерна злаковых и семян бобовых запрещается использование зерна на продовольственные и фуражные цели.

За сезон проводят от 1 до 4 обработок в зависимости от защищаемой культуры и вредного объекта.

Возможность возникновения резистентности:

для предотвращения возникновения устойчивости вредителей рекомендуется чередование с инсектицидами из других химических классов.

Совместимость:

Шарпей® совместим в баковых смесях со многими пестицидами, за исключением тех, которые имеют сильнощелочную реакцию.

Расход рабочей жидкости:

для полевых культур по всходам – 100 - 200 л/га, по вегетации – 300 - 400; садов – 1000 - 1500, виноградников – 800 - 1000 л/га. Для опрыскивания незагруженных складских помещений и оборудования зерноперерабатывающих предприятий, а также территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах используют до 200 мл рабочей жидкости на 1 м², для обработки

Инсектицид из класса пиретроидов для защиты многих сельскохозяйственных культур от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей

Культура, объект	Вредитель	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница, ячмень и тритикале яровые и озимые, овес, рожь озимая	Злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, хлебные блошки, пьявица, клопы, злаковые трипсы и минер	0,15 - 0,2	20 (2)
Свекла сахарная	Совки подгрызающие	0,4	20 (2)
Свекла сахарная (семенные участки)	Тли	0,48	- (4)
Кукуруза	Мотылек кукурузный	0,15	20 (2)
	Совка хлопковая	0,32	
Картофель	Колорадский жук, коровка картофельная	0,1 - 0,16	20 (2)
	Моль картофельная	0,16	
Картофель (семенные посадки)	Тли	0,48	- (4)
Соя	Плодожорка соевая, мотылек луговой, листоед многоядный	0,32	20 (2)
Люцерна	Фитономус	0,24	20 (2)
Крестоцветные культуры, в т. ч. рапс озимый и яровой (семенные посевы)	Цвetoед рапсовый	0,14 - 0,24	- (3)
Капуста	Белянки, моли, совки	0,16	25 (2)
Морковь	Листоблошки, муха морковная	0,5	20 (2)
Огурцы, томаты защищенного грунта	Белокрылка	1,2 - 1,6	3 (2)
Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы	0,64 - 0,8	3 (2)
Томаты	Совки подгрызающие	0,24 - 0,32	20 (1)
Яблоня	Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, жуки, тли	0,16 - 0,32	25 (3)
Виноград	Листовертки	0,26 - 0,38	25 (3)
Мачек желтый	Листоед шовный	0,3	25 (2)
Лен-долгунец (на технические цели)	Льняная блоха	0,15 - 0,2	- (1)
Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов, кроме клещей	0,8 мл/м ²	- (-)
Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		1,6 мл/м ²	- (-)
Зерно злаковых и семена бобовых		24 мл/т	- (-)

хранящегося зерна злаковых и семян бобовых – до 500 мл на 1 т зерна.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Упаковка:

канистры по 5 л.