

Фунгицид

Биксафен, 75 г/л +
протиоконазол, 100 г/л +
тебуконазол, 100 г/л

Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка: 4 х 5 л




Скайвэй
Xpro

Назначение

Инновационный фунгицид с технологией Хрго® для превосходной защиты колоса и листьев зерновых культур от комплекса болезней.

Преимущества

- Новый стандарт для защиты колоса
- Новый стандарт в защите от засухи
- Эффективное длительное защитное действие
- Уникальная дождестойкость

Химический класс

биксафен – карбоксамиды
протиоконазол – триазолинтены
тебуконазол – триазолы

Механизм действия

Наличие трех действующих веществ с различными механизмами действия позволяют эффективно контролировать возбудителей болезней на ключевых этапах развития инфекции.

В основе эффективной работы препарата лежит технология Хрго®. Инновационная технология построена на синергизме между новейшими д.в. *протиоконазол* и *биксафен* и работает по принципу 1+1=3. Благодаря взаимному усилению активных компонентов фунгицид контролирует основные болезни зерновых лучше, чем каждый элемент в отдельности.

Препарат обладает выраженным озеленяющим эффектом, повышает стабильность налива колоса в условиях повышенных температур воздуха и краткосрочных периодов засухи. Способствует формированию максимального потенциала урожайности культуры.

Биксафен – системное д.в. широкого спектра действия, подавляет прорастание спор и развитие мицелия. На биохимическом уровне ингибирует фермент сукцинатдегидрогеназу (комплекс II).

Протиоконазол и *тебуконазол* – системные д.в. защитного, лечебного и искореняющего действия, нарушают избирательность проницаемости клеточных мембран патогена, подавляют прорастание спор и развитие мицелия.

Спектр активности

Эффективен против большинства болезней зерновых колосовых культур: *мучнистой росы, септориоза листьев, септориоза и фузариоза колоса, ржавчины (видов), ринхоспориоза, желтой пятнистости (пиренофороза), сетчатой пятнистости, темно-бурой пятнистости, полосатой пятнистости* и др.

Скорость воздействия

Быстрая начальная активность с момента обработки.

Период защитного действия

Продолжительность защитного действия зависит от степени поражения растений на

Идеальная формула высоких урожаев

момент обработки, интенсивности инфекционной нагрузки, дозы внесения препарата, влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Исходя из практического опыта использования фунгицида, период защитного действия может колебаться от 3-х до 5-ти недель. Продолжительность действия увеличивается в случае профилактической обработки или при минимальной степени поражения растений (менее 2 % развития) и сокращается при значительном инфицировании культуры или в условиях эпифитотийного развития болезней.

Особенности применения

Максимальная эффективность от использования препарата достигается при его профилактическом применении. Фунгицид обеспечивает высокую эффективность, в том числе при внесении по первым признакам инфекции.

Для контроля листовых болезней рекомендуется использовать Скайвэй® Хрго в норме расхода 0,8-1,0 л/га на стадии развития зерновых – от начала выхода в трубку (стадия BBCH 30) до флагового листа (стадия BBCH 39).

Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница и тритикале озимые	Фузариоз колоса	0,8-1,25	Опрыскивание в период вегетации	41 (1)
Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,8-1,25		41 (1)
Пшеница яровая	Фузариоз колоса, мучнистая роса, септориоз листьев	0,8-1,25		42 (1)
Пшеница яровая	Септориоз колоса	1,0-1,25		42 (1)

Норма расхода рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Высокая эффективность в борьбе с септориозом и фузариозом колоса достигается при внесении дозировок фунгицида 1,0-1,25 л/га от момента полного появления колоса (стадия BBCH 59) до середины цветения (стадия BBCH 65).

Скайвэй® Хрго обладает отличной устойчивостью. Дождь через 1 час после обработки не оказывает влияния на эффективность препарата.

Селективность (фитотоксичность)

В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен к обрабатываемым культурам.

Совместимость

Совместим с большинством препаратов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

Срок годности и условия хранения

Срок хранения – не менее 2-х лет с даты изготовления при температуре от -5 °С до +40 °С.

**Эффективность Скайвэй® Хпро против фузариоза колоса на пшенице,
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г.**



Идеальная формула высоких урожаев

