

Фунгицид

Протиоконазол, 53 г/л +
спироксамин, 224 г/л +
тебуконазол, 148 г/л

Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка: 4 x 5 л



Солигор®

Назначение

Новый фунгицид для защиты зерновых, бобовых культур и озимого рапса от основных болезней.

Преимущества

- Максимальная эффективность против мучнистой росы
- Высокая эффективность против септориоза и прикорневых гнилей
- Надежен в условиях пониженных температур и засухи
- Превосходная защита от болезней с фазы начала выхода в трубку

Химический класс

протиоконазол – триазолинтионы
спироксамин – спирокеталамины
тебуконазол – триазолы

Механизм действия

Системный фунгицид защитного, лечебного и искореняющего действия. Препарат ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов на различных уровнях и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена.

Наличие в составе *спироксамина* ускоряет проникновение в ткани других действующих веществ. Солигор® уничтожает возбудителей заболеваний на всех стадиях их развития. Сочетание трех действующих веществ из разных химических классов исключает риск возникновения ре-

зистентности, расширяет спектр действия и позволяет эффективно бороться с большинством болезней в посевах зерновых культур.

Спектр активности

Мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, пиренофороз, ринхоспориоз, виды ржавчины, фузариоз и др.

Скорость воздействия

Препарат проникает в растение в течение 2-х часов с момента обработки.

Срок защитного действия

В зависимости от погодных условий, интенсивности развития болезни, восприимчивости сорта и дозы внесения период защитного действия препарата продолжается от 3-х до 5-ти недель.

Срок защитного действия более продолжительный в случае профилактической обработки или при минимальной степени поражения (менее 2% развития).

Особенности применения

Препарат предоставляет широкие возможности в использовании: Солигор® можно применять на разных стадиях развития культуры в зависимости от восприимчивости возделываемого сорта, запланированной системы защиты и времени появления заболеваний.

Скорая помощь вашим посевам

Наилучшие результаты по эффективности достигаются при профилактическом использовании фунгицида.

Солигор® в сравнении с другими фунгицидами в меньшей степени зависит от пониженных температур в весенний период. Препарат эффективен при температуре от +10-12 °С.

В зависимости от запланированных защитных мероприятий Солигор® можно использовать с фазы «начало выхода в трубку» до «флаг-листа» в одно-, двух- и трехкратных системах фунгицидной защиты зерновых культур (см. стр. 30).

Селективность (фитотоксичность)

В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен к обрабатываемым культурам.

Совместимость

Совместим с большинством препаратов и минеральных удобрений. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на смешиваемость компонентов.

Срок годности и условия хранения

Не менее 2-х лет с даты изготовления при температуре от -10 °С до +35 °С.

Регламент применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,6-1,0	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)
	Септориоз колоса	1,0		
Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев	0,6-0,8		
	Фузариоз, септориоз колоса*	0,8-1,0		
Тритикале яровая	Септориоз листьев	0,8		
Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,6-0,8		
	*Фузариоз, септориоз колоса	0,8-1,0		
Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	0,6-0,8		
	*Фузариоз колоса	0,8-1,0		
Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	0,6-0,8		

Примечание: * в стадии регистрации.

Солигор® зарегистрирован также на рапсе (см. стр. 124) и зернобобовых (см. стр. 253), ожидается регистрация на кормовых бобах (см. стр. 249).

Расход рабочего раствора при обработке наземной аппаратурой – 200-300 л/га.

**Эффективность фунгицидов против *мучнистой росы* на озимой пшенице,
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 21 мая 2012 г.**



Солигор® 0,8 л/га в ф. 30-31 – начало выхода в трубку



Контроль

Скорая помощь вашим посевам

Эффективность фунгицидов против *сетчатой пятнистости* ячменя при двукратной обработке, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 19 июля 2013 г.



Слева: **Солигор**® 0,8 л/га – по флаг-листу, **Прозаро**® 1,0 л/га – по колосу
справа: контроль



Слева: **Солигор**® 0,8 л/га – по флаг-листу, **Прозаро**® 1,0 л/га – по колосу
справа: контроль